



## COPROSMA X KIRKII



**Famille :** *Rubiaceae*

**Nom botanique :** *Coprosma x kirkii*

**Nom français :** Coprosme, plante miroir

**Nom anglais :** Mirror plant

### Description

Le *Coprosma x kirkii* est un croisement entre le *Coprosma acerosa* et le *Coprosma repens*. En pleine terre il peut atteindre 0,5 mètre de haut et 1,5 mètre d'envergure. Son port est étalé et son feuillage vert vif luisant, d'où son nom.

Le coprosme est un arbuste persistant, robuste, à la floraison blanche estivale (août, septembre) sans grand intérêt, produisant des fruits rouges ou blancs juteux et comestibles, appréciés des oiseaux. Il a une croissance rapide, est très flexible et résiste à la sécheresse et au vent.



## Distribution géographique

---

Les espèces de ce genre sont originaires des îles du Pacifique : Nouvelle-Zélande, Hawaï, Bornéo, Java, Nouvelle-Guinée, jusqu'à l'Australie. On en retrouve aussi dans les îles de l'océan Indien.

## Habitat

---

Le coprosme tolère jusqu'à -3 °C pour une courte période.

Zones de rusticité : 8 à 10

## Variétés ou espèces similaires

---

On compte 119 espèces de coprosme. Beaucoup sont des arbustes à petites feuilles persistantes mais quelques-uns peuvent arborer de plus grandes feuilles.

***Coprosma x kirkii* 'Variegata'** : variété à feuillage vert panaché de crème.

## Le coprosme comme bonsaï

---

Le cultivar 'Variegata', est recherché pour la confection de bonsaïs et idéal pour faire des shohins.

On retrouve le coprosme le plus souvent dans les styles suivants : incliné, battu par le vent, cascade et semi-cascade.

## Emplacement estival

---

Préfère le plein soleil mais peut tolérer la mi-ombre.

Par contre, le *Coprosma x kirkii* 'Variegata' risque de perdre ses panachures s'il est placé à la mi-ombre.

## Emplacement hivernal

---

À l'intérieur les températures recommandées durant le jour se situent entre 18 °C et 22 °C et quelques degrés de moins durant la nuit. Le coprosme devrait être installé à environ 30 cm d'une fenêtre orientée à l'est, le sud ou l'ouest ou encore à 15 cm sous un éclairage artificiel constitué de deux fluorescents, pendant un minimum de 12 heures par jour.

## Arrosage

---

Arroser régulièrement en été. Le coprosme préfère un sol plutôt sec qu'humide. Il résiste bien à la sécheresse une fois bien établi.



---

## Fertilisation

---

Fertiliser régulièrement pendant la période de croissance. Printemps, été et automne : aux deux semaines ou chaque semaine en diluant la dose de moitié. Ne pas fertiliser en juillet et août. En hiver, fertiliser une fois par mois.

---

## Taille et pinçage

---

La taille de formation se fait au printemps (avril, mai). Ensuite on taille et pince régulièrement pour contrôler la croissance. Le coprosme tolère bien la taille.

---

## Ligature

---

Le coprosme étant très flexible, il se ligature facilement. On peut ligaturer tout au long de l'année.

---

## Rempotage

---

Effectuer le rempotage au printemps de préférence.

---

## Substrat

---

Utiliser un substrat léger et bien drainé. Pousse bien dans un sol rocailleux ou sablonneux, au pH neutre. S'accommode d'un sol un peu acide ou alcalin et même d'un sol pauvre.

Consulter le «Tableau de rempotage» et utiliser les proportions pour les tropicaux.

pH idéal : 7

---

## Maladies

---

Le coprosme est peu sujet aux maladies.

---

## Insectes

---

Faire attention aux cochenilles, qui peuvent favoriser l'apparition de la fumagine. Porter particulièrement attention en hiver, à cause de l'atmosphère sec de nos maisons. Vaporiser régulièrement aide à éviter les infestations.

---

## Multiplication

---

Par bouturage en été.

Rédaction : Paul Laurendeau

Mise en page : Louise Gendron